

CAS CLINIQUE 4

Madame S... Germaine, âgée de 66 ans, vient vous consulter pour des céphalées frontales transitoires, fréquentes en fin de journée. Cette patiente en bonne santé, sans aucun antécédent ORL, n'a pour traitement que du Levothyrox depuis 5 ans pour une insuffisance thyroïdienne. A l'interrogatoire, on note que sa vision de loin aurait baissé progressivement depuis un an environ. Par contre la patiente s'étonne de ne plus avoir besoin de ses lunettes de presbyte pour la lecture ! L'interrogatoire permet de noter qu'une légère photophobie avait conduit Madame S... à voir un ophtalmologiste l'an dernier : ce dernier lui avait simplement signalé la présence d'une cataracte débutante.

Question 1 : Quels sont les signes fonctionnels qui vous paraissent en rapport avec ce diagnostic de cataracte ?

Question 2 : D'après la description de la patiente, quel type de cataracte peut être suspecté ? Justifiez votre réponse.

Question 3 : Le diagnostic de cataracte est confirmé par l'examen à la lampe à fente. Mais la mesure de la pression intra oculaire (PIO) donne 23 mm Hg du côté droit et 26 mm Hg du côté gauche. Que pensez-vous de ces chiffres ? Quels examens complémentaires vous paraissent alors indispensables ?

Question 4 : L'examen du fond d'œil de cette patiente met aussi en évidence des « drusen maculaires » des deux côtés. Que représentent ces lésions ?

Question 5 : Cette patiente maintenant traitée avec un collyre bêta bloquant pour son hypertension oculaire, revient en urgence 4 mois plus tard pour une baisse récente de sa vision de près du côté droit, accompagnée de « métamorphopsies ». Définissez ce symptôme. Quels examens cliniques et paracliniques doivent être réalisés rapidement et dans quel but ?

Question 6 : Les examens que vous avez prescrits montrent la présence à droite d'un néovaisseau choroïdien de petite taille ; à gauche on n'observe que la présence de drusen nombreux. Quels traitements peuvent être proposés pour traiter l'œil droit et dans quels délais ?

Question 7 : Quelles méthodes de surveillance vous semblent nécessaires pour les lésions rétinienne de l'œil gauche ?